

LA CONSOMMATION DE TABAC EN FRANCE : PREMIERS RÉSULTATS ISSUS DU BAROMÈTRE SANTÉ 2017

Rencontres de Santé publique France, 30 mai 2018

Anne Pasquereau, Raphaël Andler, Romain Guignard, Jean-Baptiste Richard, Pierre Arwidson, Viêt Nguyen-Thanh ;
le groupe Baromètre santé 2017

Cette intervention est faite en tant que personnel de Santé publique France, organisateur de la manifestation. Je n'ai pas de lien d'intérêts avec le sujet traité.

CONTEXTE


- Dans le cadre du **Programme National de Réduction du Tabagisme (PNRT) 2014-2019**, de nombreuses mesures ont été mises en place en fin d'année 2016 :
 - Forfait de remboursement augmenté à 150 € (1^{er} novembre 2016)
 - Paquet neutre (obligatoire au 1^{er} janvier 2017)
 - Dispositif de marketing social Moi(s) sans tabac (novembre 2016)
 - Nouvel outil avec l'application pour smartphone (octobre 2016)
- L'efficacité de ces mesures pour lutter contre le tabagisme a été montré dans d'autres pays
- Résultats du Baromètre santé 2017 : **état des lieux descriptif** après la mise en place de ces mesures
- **Evolutions** récentes du tabagisme : hausse entre 2005 et 2010 puis stabilité entre 2010 et 2016. Accroissement des inégalités sociales en matière de tabagisme.

MÉTHODES

- **Les enquêtes Baromètres santé**
 - L'enquête de référence pour mesurer les comportements de santé
 - Enquête menée depuis 1992 par le CFES puis l'Inpes, puis Santé publique France
 - Echantillon construit de manière aléatoire, enquête représentative de la population française

- **Baromètre santé 2017**
 - **25 319** personnes interrogées par téléphone
 - France métropolitaine
 - Tranche d'âge : **18-75 ans**
 - Terrain de janvier à juillet 2017
 - Principales thématiques abordées : addictions (dont tabagisme) et santé mentale

TABAGISME QUOTIDIEN : 1 MILLION DE FUMEURS QUOTIDIENS EN MOINS EN UN AN

2016 : **29,4 %**  2017 : **26,9 %** des 18-75 ans déclaraient fumer quotidiennement


- Diminution de 2,5 points par rapport à 2016, soit environ 1,0 million de fumeurs quotidiens adultes en moins

TABAGISME ACTUEL : QUOTIDIEN + OCCASIONNEL

2016 : 35,1 %  2017 : **31,9 %** des 18-75 ans interrogés déclaraient fumer


- Diminution de 3,2 points par rapport à 2016, soit environ 1,4 million de fumeurs adultes en moins
- La part de personnes n'ayant jamais fumé est au hausse de 34,3 % à 37,1 %

RÉSULTATS : TABAGISME QUOTIDIEN SELON LE SEXE, 18-75 ANS, 2000-2017




➤ Ces baisses sont observées parmi les hommes et les femmes

RÉSULTATS : TABAGISME QUOTIDIEN SELON LE SEXE ET L'ÂGE, 2000-2017



Sources : Baromètres santé 2000, 2005, 2010, 2014, 2016 et 2017, Santé publique France.
Les * indiquent une évolution significative entre 2016 et 2017 : * p<0,05 ; *** p<0,001

RÉSULTATS : TABAGISME QUOTIDIEN PAR RÉGION EN 2017, 18-75 ANS



➤ Prévalence **moins élevée** que le reste du territoire métropolitain :


Ile-de-France (21%)
Pays de la Loire (23%)

➤ Prévalence **plus élevée** :

Grand-Est (30%)
Occitanie (30%)
Hauts-de-France (30%)
PACA (32%)


➤ Par rapport à 2014, deux régions sont en baisse significative : Ile-de-France et Normandie

RÉSULTATS : TABAGISME QUOTIDIEN SELON LE REVENU, 2000-2017



- Diminution parmi les personnes dont le revenu correspondait à la tranche la plus basse (1er tercile), de 38,8% à 34,0%
- Après une hausse continue depuis 2000, c'est la première fois que la prévalence du tabagisme quotidien diminue parmi les personnes ayant les niveaux de revenus les moins élevés

RÉSULTATS : TABAGISME QUOTIDIEN SELON LA SITUATION PROFESSIONNELLE, 2000-2017, 18-65 ANS



- **Diminution parmi les personnes au chômage de 49,7 % à 43,5 % et parmi les étudiants de 28,3% à 23,8 %**
- Après une hausse puis une stabilité, c'est la première fois également que la prévalence tabagique diminue parmi les demandeurs d'emploi.


Cigarette électronique

- En 2017, 41,7 % des 18-75 ans déclaraient avoir expérimenté la e-cigarette
- 3,8 % des personnes de 18-75 ans interrogées déclaraient vapoter, proportion stable par rapport à 2016
- La prévalence du vapotage quotidien était également stable et s'élevait à 2,7%
- Les liens entre statut tabagique, arrêt du tabac et vapotage seront étudiés ultérieurement

Cohérence de ces résultats avec d'autres données françaises

- La consommation de tabac a diminué parmi les collégiens, lycéens et les jeunes de 17 ans (OFDT). Le tabac a désormais une **image négative pour les jeunes** (enquête Aramis, OFDT).
- En 2017, les livraisons de traitement pour l'arrêt du tabac aux pharmacies ont augmenté de 28,5 % par rapport à 2016. Les livraisons de tabac aux buralistes sur l'ensemble de sont en baisse de 1,4 %.

Mais des niveaux différents selon les pays pour le tabagisme actuel...



Conclusion

L'ensemble des mesures réglementaires et de prévention ont créé un **contexte fort de lutte anti-tabac** qui a certainement contribué à cette baisse de la prévalence du tabagisme d'ampleur inédite depuis une dizaine d'années. Importance de développer des actions cohérentes et intégrées

MERCI

29 MAI

BEH  *Bulletin épidémiologique hebdomadaire*

Pasquereau A, Andler R, Guignard R, Richard J-B, Arwidson P, Nguyen-Thanh V ; le groupe Baromètre santé 2017. La consommation de tabac en France en 2017 : premiers résultats issus du Baromètre santé 2017. BEH, 2018;(14-15):265-73.

Analyse des facteurs associés au tabagisme quotidien

- En 2017, chaque caractéristique socio-économique (diplôme, revenu, situation professionnelle et catégorie socioprofessionnelle) était associée à la consommation de tabac indépendamment, à sexe et âge égaux par ailleurs
- Un gradient est observé pour chacune des caractéristiques socio-économiques :
 - l'odds ratio associé au tabagisme quotidien diminuait lorsque le diplôme augmentait
 - l'odds ratio associé au tabagisme quotidien diminuait lorsque le revenu augmentait
 - Le tabagisme quotidien était également associé à la situation de chômage
 - le fait d'être cadre ou profession intellectuelle supérieure était moins souvent associé au tabagisme quotidien que toutes les autres professions et catégories socioprofessionnelles
- L'évolution des facteurs associés entre 2016 et 2017 montre que les inégalités sociales en matière de tabagisme se sont stabilisées en 2017, après un accroissement continu depuis 2000. Seul l'odds ratio correspondant à l'association entre la consommation quotidienne de tabac et le fait d'être en recherche d'emploi diminue (OR passant de 1,7 à 1,5), les autres odds ratios restant stables.

Facteurs associés au tabagisme quotidien en 2017 en France

	%	OR	IC à 95%
Diplôme	***		
Aucun diplôme (réf.) (n=1608)	36,3	1	
<Bac (n=7991)	29,3	0,8*	[0,7-1,0]
Bac (n=5415)	27,6	0,6***	[0,5-0,7]
>Bac (n=10209)	19,8	0,5***	[0,4-0,5]
Revenu par unité de consommation	***		
1er tercile (réf.) (n=7237)	34,0	1	
2e tercile (n=8259)	26,4	0,9**	[0,8-1,0]
3e tercile (n=8604)	19,5	0,8***	[0,7-0,9]
Refus (n=1184)	22,2	0,6***	[0,5-0,7]
Situation professionnelle	***		
Travail (réf.) (n=14369)	29,0	1	
Chômage (n=1814)	43,5	1,5***	[1,3-1,7]
Inactif (n=9101)	19,3	0,9	[0,8-1,1]
PCS de l'individu ou du référent du foyer	***		
Agriculteurs Art., comm., chefs d'entr. (n=1972)	26,8	1,5***	[1,3-1,8]
Cadres et prof. int. sup. (réf.) (n=4604)	15,9	1	
Prof. inter. (n=7050)	23,9	1,4***	[1,2-1,6]
Employés (n=6865)	27,4	1,4***	[1,2-1,6]
Ouvriers (n=4532)	36,4	1,7***	[1,4-1,9]

*** : p<0.001 ; ** : p<0.01 ; * p<0.05

Modèle ajusté sur le sexe et l'âge