

BAISSE DE LA PRÉVALENCE DU TABAGISME QUOTIDIEN PARMIS LES ADULTES : RÉSULTATS DU BAROMÈTRE DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE 2018

Rencontres de Santé publique France, 4 juin 2019

Raphaël Andler, Jean-Baptiste Richard, Romain Guignard, Guillemette Quatremère,
Florian Verrier, Jessica Gane, Viêt Nguyen-Thanh


Cette intervention est faite en tant que personnel de Santé publique France, organisateur de la manifestation.
Je n'ai pas de lien d'intérêts avec le sujet traité.

- **Programme national de lutte contre le tabac (PNLT) 2018-2022**
(faisant suite au programme national de réduction du tabagisme (PNRT) 2014-2019) :
 - Prévenir le tabagisme
 - Réduire la consommation de tabac chez les usagers actuels
 - Protéger les non-fumeurs du tabagisme passif
- **Baisse de la prévalence du tabagisme quotidien de 29,4% à 26,9% entre 2016 et 2017 parmi les 18-75 ans** (Baromètre de Santé publique France 2017)
- Questions : cette baisse est-elle confirmée en 2018 ? Les inégalités sociales se réduisent-elles ?

- **Les enquêtes Baromètres santé**
 - L'enquête de référence pour mesurer les comportements de santé
 - Enquête menée depuis 1992 par le CFES puis l'INPES et aujourd'hui Santé publique France
 - Echantillon construit de manière aléatoire, enquête représentative de la population française

- **Baromètre de Santé publique France 2018**
 - **9 074** adultes interrogés par téléphone
 - France métropolitaine
 - Tranche d'âge : **18-75 ans**
 - Terrain de janvier à juillet 2018
 - Questionnaire centré sur les comportements tabagiques


STATUT TABAGIQUE DES 18-75 ANS EN FRANCE EN 2017 ET 2018



Sources : Baromètres de Santé publique France 2017 et 2018

➤ Seule différence significative : proportion de fumeurs quotidiens


PRÉVALENCE DU TABAGISME QUOTIDIEN SELON LE SEXE, 18-75 ANS, 2000-2018



Sources : Baromètres santé 2000, 2005, 2010, 2014, 2016, Baromètre cancer 2015 et Baromètres de Santé publique France 2017 et 2018

➤ La baisse uniquement significative pour l'ensemble des 18-75 ans entre 2017 et 2018


PRÉVALENCE DU TABAGISME QUOTIDIEN SELON LE NIVEAU DE DIPLÔME, 18-75 ANS, 2000-2018



Sources : Baromètres santé 2000, 2005, 2010, 2014, 2016 et Baromètres de Santé publique France 2017 et 2018

➤ La baisse n'est significative que pour les personnes non diplômées entre 2017 et 2018


PRÉVALENCE DU TABAGISME QUOTIDIEN SELON LE NIVEAU DE REVENU, 18-75 ANS, 2000-2018



Sources : Baromètres santé 2000, 2005, 2010, 2014, 2016 et Baromètres de Santé publique France 2017 et 2018

➤ aucune évolution significative entre 2017 et 2018

PRÉVALENCE DU TABAGISME QUOTIDIEN SELON LA SITUATION PROFESSIONNELLE, 18-75 ANS, 2000-2018




Sources : Baromètres santé 2000, 2005, 2010, 2014, 2016 et Baromètres de Santé publique France 2017 et 2018

➤ aucune évolution significative entre 2017 et 2018

	2017	2018
expérimentation	32,8%	34,7%**
usage actuel	3,8%	5,3%***
usage quotidien	2,7%	3,8%***

Usage de l'e-cigarette selon le statut tabagique, 18-75 ans, 2018



- **Enquête ESCAPAD 2017 : niveaux de consommation à 17 ans**

- Baisse importante entre 2014 et 2017 : niveau le plus bas depuis plusieurs décennies.


- Baisse très marquée chez les filles

- **Enquête ARAMIS : représentations**

- L'analyse de représentations montre une dénormalisation du tabac dans les nouvelles générations. Le tabac n'a pas l'image festive qu'ont le cannabis et l'alcool.

- la cigarette garde un rôle d'intégration sociale dans les filières professionnelles.

- Une image positive persiste au sein des jeunes filles de milieu favorisé



Source : enquêtes ESCAPAD, OFDT

En 2017, la prévalence du tabagisme quotidien avait baissé, baisse d'ampleur inédite en France depuis 2005.

- ⇒ Les données du Baromètre de Santé publique France 2018 confirment cette baisse : **la prévalence du tabagisme quotidien a de nouveau baissé, passant de 26,9 % en 2017 à 25,4 % en 2018 parmi les adultes.**
- ⇒ De plus, la stabilisation des inégalités sociales de santé concernant la consommation de tabac observée en 2017 est également confirmée en 2018.
- ⇒ Néanmoins, ces **inégalités sociales restent très marquées** : les personnes les moins favorisées (chômeurs, personnes peu ou pas diplômées, revenus faibles) sont plus fréquemment fumeuses que les autres.

merci pour votre attention



Andler R, Richard JB, Guignard R, Quatremère G, Verrier F, Gane J, Nguyen-Thanh V. Baisse de la prévalence du tabagisme quotidien parmi les adultes : résultats du Baromètre de Santé publique France 2018. Bull Epidemiol Hebd. 2019;(15):271-7.

Autres références :

Pasquereau A, Andler R, Guignard R, Richard J-B, Arwidson P, Nguyen-Thanh V ; le groupe Baromètre santé 2017. La consommation de tabac en France en 2017 : premiers résultats issus du Baromètre santé 2017. BEH, 2018;(14-15):265-73.

Le Nézet O, Janssen E, Brissot A, Philippon A, Shah J, Chyderiotis S, et al. Les comportements tabagiques à la fin de l'adolescence. Enquête Escapad 2017. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 2018;14-15:274-82.

Obradovic I. Représentations, motivations et trajectoires d'usage de drogues à l'adolescence. OFDT, 2017.